

Bij wie wordt een screening op HCV uitgevoerd?

Routinematig

Gebaseerd op de verhoging van het infectierisico, bij:

- iedereen onder invloed van drugs;
- zij die stollingsfactoren kregen voor 1987;
- zij die bloed kregen of een transplantatie kregen voor 1992;
- zij die een chronische hemodialyse genoten;
- dragers van een leverziekte, eender welke type;
- zij die een storing van hun leverenzymen vertonen.

Gebaserend op het besmettingsgevaar, bij:

- verpleegkundigen, urgentiediensten, arbeiders blootgesteld aan naalden gebruikt bij HCV patiënten of lichaamsvloeistoffen van diezelfde mensen;
- kinderen van HCV+ moeders.

Uitzonderlijk

- Verpleegkundigen, urgentiediensten, gezondheidsarbeiders (ambulanciers, etc.)
- Zwangere vrouwen
- De directe omgeving van HCV+ personen
- De algehele bevolking

Routinematig?

Niet bevestigd als risicofactor of met ongekende prevalentie

- getransplanteerden
- druggebruikers zonder IV injecties of intranasale cocaïne
- personen die een piercing of tatoeage kregen

Bevestigde risicofactor maar met een zwakke prevalentie voor infectie

- meerdere seksuele partners of antecedenten van Soa;
- stabiele langdurige seksuele relaties met een HCV-positieve partner.